

COVID-19:

¿Qué pasa con la vacuna?



Después de la primera dosis, ¿puedo volver a la normalidad y dejar de lado las medidas preventivas? (lavado de manos, cubrebocas, distanciamiento social, etc.)

Respuesta: No, es necesario continuar con las medidas preventivas.

Explicación:

- La vacuna contra COVID-19 NO previene completamente que una persona contraiga la infección y se enferme; sino que reduce la severidad de la enfermedad en caso de infección.

- Aún no está claro si una persona que ha sido vacunada puede transmitir el virus a otros. Sin embargo, con la información disponible hasta el momento, se espera que prevenga la transmisión.



¿Qué sucederá si no tengo la segunda dosis dentro del intervalo recomendado?

Respuesta:

- En México, la única vacuna usada, de una sola dosis, es la de CanSino Biologics.
- En las demás, las dos dosis son requeridas para estimular y aumentar la respuesta del sistema inmune.

Explicación:

- En cuanto a la vacuna Pfizer BioNTech, no existen datos que sugieran el mantenimiento de la protección después de 21 días, si no se recibe la segunda dosis en ese momento.
- Respecto a la vacuna Astra Zeneca, investigadores sugieren que el espacio entre ambas dosis de 8-12 semanas puede incrementar la eficacia.
- Sin embargo, existe la preocupación de que, además de la protección ineficaz de los pacientes hasta no recibir la segunda dosis, esta práctica puede propiciar el desarrollo de cepas resistentes.

Recomendación:

- En cuanto esté disponible la vacuna correspondiente, solicite su segunda dosis.

Respecto a las dos dosis que tengo que recibir, ¿tienen que ser ambas del mismo tipo?

Respuesta: Idealmente, la primera y la segunda dosis deben ser de la misma vacuna.

Explicación:

- Todas las vacunas disponibles están basadas en la proteína "Spike", por lo que es posible que la segunda dosis ayude a aumentar la respuesta de la primera dosis, incluso si es una vacuna diferente.
- Puede recibir una vacuna diferente para cada dosis en casos excepcionales como:
 - Que no estén disponibles las dosis de la misma vacuna.
 - No exista un registro de qué vacuna se le aplicó en la 1° dosis.

Recomendación:

Conserve el registro de aplicación de ambas dosis en su cartilla de vacunación.

